

Headline	WHO New guidelines to prevent HIV		
MediaTitle	China Press		
Date	02 Jul 2013	Color	Full Color
Section	Sport	Circulation	235,798
Page No	B8	Readership	659,000
Language	Chinese	ArticleSize	75 cm <sup>2</sup>
Journalist	N/A	AdValue	RM 1,364
Frequency	Daily	PR Value	RM 4,091



## 世衛新指引 倡早治愛滋

(吉隆坡1日综合电)世界卫生组织公布新指引,建议提早为感染爱滋病毒者在诊断后接受药物治疗。

世卫组织周日在马来西亚吉隆坡举行国际爱滋病学会会议,建议当人体内对抗免疫系统感染的T细胞数值降至500时,应开始为患者治疗。

T细胞为免疫系统对抗感染的关键细胞,人体正常T细胞数值为500至1600。而当T细

胞受爱滋病毒(HIV病毒)攻击,至细胞数值降至200以下时,病人将被定为感染爱滋病。

世卫组织以往建议当病人的T细胞值降至350时才展开治疗,如今的新建议为细胞数值为500。

资料显示,现时全球约有3400万人感染爱滋病毒;许多富裕国家早已提倡及早治疗病患者。不过目前在发展中国家中有900万人虽然符合治疗资格,但只有60%患者获得所需治疗。新指引影响最大的,是现时有近70%人感染爱滋病毒的非洲地区。

世卫组织补充,5岁以下幼童、孕妇、哺乳妇女、伴侣未感染爱滋病毒者、罹患结核病或B型肝炎等人士,都应在确诊感染爱滋病毒后,及早接受治疗。